



Kaartblad 19 & 20 VEURNE - ROESELARE - Quartairgeologische Profieltypenkaart



- X1: kiel en/of zand voor de gehele sequentie zonder veenlaagen.
- X11: kiel en/of zand van een Laat - Holocene geulopvulling over de gehele sequentie.
- X2: kiel en/of zand met aan de basis het basisveen.
- X3: kiel en/of zand over de gehele sequentie met aan het huidige oppervlak een dunne veenlaag.
- Y2: kiel en/of zand met intercalaties van één of meerdere verlandingsvenen en aan de basis het Basisveen.
- Z3: veen en/of organisch gyttja over de gehele sequentie met aan de top een kiel- of zandlaag waarvan de dikte kleiner is dan de dikte van de veenlaag.
- W1: kiel en/of zand over de gehele sequentie bedekt met eolische afzettingen.
- W3: kiel en/of zand over de gehele sequentie bedekt met een veenlaag direct onder de eolische afzettingen.
- Lemig tot zandlemig materiaal zonder bodemprofielontwikkeling ontstaan door hellingprocessen.
- Fluviatiele afzettingen met een textuur variërend van kiel tot zand, mogelijk veen ontwikkeld.
- Zandig tot kleilig materiaal minder dan 1,2m dik.
- Zandige tot zandlemige eolische afzettingen mogelijk met een alternatie van zand- en siltlagen onderaan.
- Hellingsafzettingen en lokale fluviatiele afzettingen met een textuur variërend van kleilig tot zandig.
- Zandige vliedende rivierafzettingen (zeer fijn tot medium zand, soms met siltuze intercalaties die venig kunnen zijn).
- Complex van zandige en siltuze fluviatiele afzettingen, lokaal zijn hellingsafzettingen mogelijk.
- Fijn/zandige tot siltuze fluviatiele afzettingen.
- Mariene afzettingen bestaande uit schelphoudende tot schelprijke afzettingen in het meest kustwaarts gedeelte. Meer landwaarts zijn ze opgebouwd uit fijn zand tot kiel met sporadisch veen.
- Estuariene - fluviatiele afzettingen bestaande uit fijn kleistich materiaal met veenintercalaties.
- Getijdenafzettingen met een textuur variërend van zand tot kiel. In de zandafzettingen komt Cerastoderma glaucum frequent voor.
- Enheid geheel of gedeeltelijk weggeëroerd
- Enheid mogelijk aanwezig
- Enheid mogelijk afwezig
- Afbakening kustvlakte



CHRONO STRATIGRAFIE		KARTEERENHEDEN	
HOLOCEN	BOVEN	GETIJDENAFZETTINGEN	CONTINENTALE AFZETTINGEN
	MIDDELEN		
PLEISTOCEEN	BOVEN		
	MIDDELEN		

De kilometerische gemiddelde sanzietstreejes duiden het LAMBERT-nulmeten aan. Belgische Lambert projectie (Belgium Datum 1972 en ellipsiode van Hayford 1924)

Kaart opgemaakt in 2001 door: In opdracht van: Vlaams overheid
Frieda Bogemans Dienst Natuurlijke Rijdommen
Vrije Universiteit Brussel Koning Albert II-laan 20 bus 20
B-1000 BRUSSEL

Depotnummer: D/2006/341/256
Idn: 90-403-0260-X0
Nur: 905

Kaartblad (19 & 20) VEURNE - ROESELARE
Quartairgeologische Profieltypenkaart

Schaal: 1/50.000

