


PROFIEL 1 EN 2 BIJ KAARTBLAD (19-20)
VEURNE - ROESELARE



LEGENDE

Kw Quartaire afzettingen

Kw

Ge Formatie van Gent (Onder Eoceen)

GeVI

Lid van Vierzele
Grijsgroen, glauconiethoudend fijn zand, met kleilenzen; plaatselijk dunne zandsteenbankjes.

GePI

Lid van Pitten
Grijs, glauconiethoudend, sterk kleihoudend zeer fijn zand, ongeveer 5 m dik. Aan de basis komt een donkergrijze klei tot kleihoudende zandlaag van ongeveer 2 m voor. Er waren echter te weinig gegevens voorhanden om deze laag afzonderlijk te karteren.

Tt Formatie van Tielt (Onder Eoceen)

TtEg

Lid van Egem
Grijs, glimmer- en glauconiethoudend fijn zand, afgewisseld met kleilagen; ongeveer 15 m dik.

TtKo

Lid van Kortemark
Groengrijze zware klei, weinig silthoudend, ongeveer 15 m dik.

Ko Formatie van Kortrijk (Onder Eoceen)

KoAa

Lid van Aalbeke
Donkergrijze zware klei met glimmers; ongeveer 10 m dik.

KoMo

Lid van Moen
Grijze kleige silt tot klei; gemiddeld 60 m dik.

KoSm


Lid van Saint-Maur
Grijze klei, gemiddeld 20 m dik. Bij geofysische boorgatmetingen is er een duidelijk onderscheid tussen een bovenste deel (KoSm2) gekenmerkt door lagere resistiviteiten, en een onderste deel (KoSm1) met iets hogere resistiviteiten.

LA Groep van Landen (Boven Paleoceen)

LA

Grijs, glauconiethoudend, fijn zand, naar onder overgaand in donkergrijze zandhoudende klei, gemiddeld 40 m dik.

Schaal : 1/50.000



Hoogteschaal : 1/1000

Hoogteoverdrijving : 50 x