



MEER WETEN?

Twijfel je of je het juiste medicijn neemt, krijg je klachten door het gebruik van het medicijn of heb je vragen over de behandeling?

Contacteer dan je behandelende arts of de arts of verpleegkundige infectieziektebestrijding van het

Departement Zorg in je provincie:

- Antwerpen: 02 553 08 92
- Limburg: 02 553 08 93
- Oost-Vlaanderen: 02 553 08 94
- Vlaams-Brabant: 02 553 08 93
- West-Vlaanderen: 02 553 08 94

Je kunt ook terecht bij de verpleegkundige van de **Respiratoire Gezondheid** in je provincie:

- Antwerpen
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62
- Brussel: 02 411 94 76
- Limburg: 011 22 10 33 (Hasselt)
- Oost-Vlaanderen: 09 225 22 58 (Gent)
- Vlaams-Brabant: 016 79 09 92 (Leuven)
- West-Vlaanderen
Oostende: 059 79 02 58 - Kortrijk: 059 79 02 57

v.u. Karine Moykens, Secretaris-generaal, Departement Zorg, Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel | oktober 2025

Geneesmiddelen kunnen soms **bijwerkingen** geven.

Volgende bijwerkingen zijn mogelijk:

- leverproblemen al dan niet met geelzucht
- vermoeidheid
- hoofdpijn, duizeligheid
- concentratiestoornissen
- jeuk al dan niet met huiduitslag
- maagdarmlachten

Besprek eventuele bijwerkingen met de (huis)arts die het medicijn voorschreef. Het geneesmiddel Rifampicine doet de lichaamsvochten steeds oranje verkleuren. Maak je daarover geen zorgen want de oranje verkleuring is een normale reactie en onschuldig.

Blijf steeds alert voor klachten zoals:

- langdurige hoest
- vermagering
- nachtzweeten
- verminderde eetlust
- algemeen onwel zijn
- achteruitgang van de algemene toestand
- pijn op de borst.

Ga bij aanhoudende klachten naar je huisarts.

**RESPIRATOIRE
GEZONDHEID**
VRGT

Departement Zorg
infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
www.departementzorg.be



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

BESMET MET TUBERCULOSE

maar niet ziek

**DEPARTEMENT
ZORG**

departementzorg.be

BESMET MAAR NIET ZIEK

Positieve huidtest

Onlangs is er bij jou een tuberculinehuidtest geplaatst om te bekijken of je besmet bent met de bacterie die tuberculose kan veroorzaken.

Die huidtest was positief. Dat betekent dat je besmet bent. De test kan ook positief zijn als je in het verleden ooit gevaccineerd bent tegen tuberculose.



In sommige landen wordt er nog gevaccineerd tegen tuberculose. Dat biedt geen volledige en levenslange bescherming.

Een positieve tuberculinehuidtest is dan moeilijk te interpreteren en kun je het best verder bespreken met je arts.

Negatieve longfoto

Daarnaast is er bij jou een longfoto gemaakt om te beoordelen of je longen zijn aangetast. Tuberculose is immers vooral een ziekte van de longen.

Op die foto zijn nu geen afwijkingen zichtbaar. Dat betekent dat je op dit moment niet ziek bent. Je bent ook niet besmettelijk voor je omgeving.

WELKE GENEESMIDDELEN MOET IK NEMEN?



Er is een groot verschil tussen besmet zijn met de tuberculosebacterie en effectief ziek zijn.

90% van de besmettingen leidt nooit tot ziekte. Het lichaam reageert op een besmetting door afweerstoffen aan te maken. Dat is een beschermende activiteit van het lichaam. Vaak kan zo het ontstaan van échte ziekte voorkomen worden. Soms zijn die afweerstoffen echter niet voldoende om ervoor te zorgen dat je geen tuberculose ontwikkelt.

Bij een positieve test is medicatie aanbevolen om te voorkomen dat je ziek wordt. Bespreek dit met je arts.

In de meeste gevallen zal dit isoniazide (merknaam Nicotibine ®) en/of rifampicine (merknaam Rifadine ®) zijn. Deze geneesmiddelen zijn gratis te verkrijgen op voorschrift.

MAG IK ANDERE MEDICIJNEN NEMEN TIJDENS MIJN BEHANDELING?

Vertel je behandelende arts altijd welke andere medicijnen je neemt. Ook als je anticonceptie (zoals de pil) gebruikt. Door de medicijnen werkt de pil minder goed. Je kunt dan toch zwanger worden.

WAAR MOET IK OP LETTEN ALS IK GENEESMIDDELEN NEEM?

Het is belangrijk dat je de geneesmiddelen elke dag inneemt gedurende de voorgeschreven tijd (die vaak langdurig is). Anders heeft de behandeling geen zin en kan de bacterie ongevoelig worden voor de geneesmiddelen.

- Je neemt de geneesmiddelen het best nuchter op een vast tijdstip, 1 keer per dag.
- De geneesmiddelen bestaan in de vorm van tabletten, poeders of een drankje.
- Voor jonge kinderen kan de medicatie een 30-tal minuten voor het ontbijt ingenomen worden met een lepeltje grenadine.
- Tijdens je behandeling kun je beter geen alcohol drinken omdat dit een slecht effect op je lever kan hebben.
- Sommige mensen zijn overgevoelig voor de zon wanneer ze het medicijn gebruiken. Daarom wordt het afgeraden langdurig in de zon te zitten.
- Verander je medicatie niet zelf zonder overleg met je arts.

