



Vlaanderen
is diervriendelijk



Huisdierwijzer ara's

▲ Ara sp. - Anodorhynchus sp. - Cyanopsitta sp.
Orthopsittaca sp. - Primolius sp. - Diopsittaca sp.

////////////////////////////////////

HUISDIERWIJZER: ARA'S

Ara sp.

Anodorhynchus sp.

Cyanopsitta sp.

Orthopsittaca sp.

Primolius sp.


Diopsittaca sp.

////////////////////////////////////

INHOUD

1	Overzicht	3
2	Natuurlijk gedrag en behoeften	4
3	<i>Huisvesting en verzorging</i>	6
3.1	Huisvesting	6
3.1.1	Gezelschap	6
3.1.2	Verblijf	6
3.1.3	Verrijking	7
3.2	Voeding	7
3.3	Dagelijkse verzorging	8
4	Gedrag en omgang met het dier	8
5	Gezondheid	10
5.1	Voortplanting en bijhorend gedrag	10
5.2	Meest voorkomende gezondheidsproblemen	10
6	Aankoop of adoptie.....	11
7	Kosten	12

1 OVERZICHT



2 NATUURLIJK GEDRAG EN BEHOEFTE

Ara's zijn felgekleurde, van origine Zuid-Amerikaanse papegaaien. Er leven soorten in het tropisch Amazonegebied, in Brazilië, Colombia en Venezuela en sommige in Midden-Amerika, in Panama, Honduras, Costa Rica en Guatemala. Deze landen hebben een tropisch-regenwoudklimaat met weinig verschillen tussen de seizoenen op het vlak van lichturen. De temperatuur bedraagt 13 tot 35 °C. Het is er heel zonnig, met een hoge uv-straling. Een aantal soorten, o.a. de soldatenara's, kunnen ook uv-licht waarnemen en dit helpt hen bij de communicatie met soortgenoten. Tijdens het regenseizoen loopt de luchtvochtigheid hoog op. Afhankelijk van de oorsprong van de ara verschilt de behoefte aan luchtvochtigheid, voer en temperatuur.

De vogels zijn allemaal zeer sociaal en leven in groepen. Ze vormen koppels voor het leven en hebben, binnen de groep, een eigen nest met territorium. De gevormde paren zijn een onderdeel van de grotere groepen. In een groep onderhouden ze ook vriendschappen met andere vogels, buiten het koppel.

Ara's zijn overdag actief en slapen 's nachts in nesten en holle bomen. Als groep zijn ze alert voor gevaar en gaan ze samen op zoek naar voedsel. Ze eten veel soorten noten, zoals palmpitten en amandelen, en ze eten graag allerlei soorten tropisch fruit. De bijtkracht van de ara is zeer groot. De hyacintara heeft de grootste snavel en bijtkracht en kan gemakkelijk harde noten openbreken. Sommige soorten hebben speciale gedragingen ontwikkeld, zoals het oppikken van bepaalde soorten zuiverende klei. Mogelijk helpt de klei de vogels om aan bepaalde mineralen te komen.

Ara's kunnen veel verschillende geluiden maken, van zacht fluiten tot krijsen. Ze kunnen ook geluiden nabootsen. Ze communiceren met roepen die verschillend zijn per soort en groep.

Er zijn acht soorten echte ara's, met ondersoorten, en een groep van nog vijf papegaaisoorten die ook de naam 'ara' hebben, maar die uit een andere familie komen. Alle soorten hebben een ander uiterlijk en gedragingen. Opvallend aan alle ara's zijn hun prachtige felle kleuren, waardoor je ze gemakkelijk kan herkennen. Het zijn zeer intelligente dieren en de grotere soorten kunnen wel 80 jaar oud worden.

Indeling in het dierenrijk

Rijk	<i>Animalia</i> (dieren)
Stam	<i>Chordata</i> (chordadieren)
Klasse	<i>Aves</i> (vogels)
Orde	<i>Psittaciformes</i> (papegaaiachtigen)
Familie	<i>Psittacidae</i> (papegaaien van Afrika en de Nieuwe Wereld)
Geslacht	<i>Ara</i> , <i>Anodorhynchus</i> , <i>Cyanopsitta</i> , <i>Orthopsittaca</i> , <i>Primolius</i> , <i>Diopsittaca</i> (ara's)

Enkele soorten ara's en hun kenmerken

Soort	Afbeelding	Info	Grootte & gewicht	Beschermings-status
Blauwgele ara (<i>Ara ararauna</i>)		Hebben een groot verspreidingsgebied en kunnen grote afstanden per dag vliegen.	85 cm 1300-3900 g	IUCN- status: niet bedreigd
Groenvleugel ara (<i>Ara chloropterus</i>)		Hebben een groot verspreidingsgebied en kunnen grote afstanden per dag vliegen.	90 cm 1300 g	IUCN-status: niet bedreigd
Kleine soldatenara (<i>Ara militaris</i>)		Een van de weinige soorten die op grote hoogtes voorkomt en ook broedt in zeer hoge bomen of in groeves van kliffen	70 cm 970 g	IUCN-status: kwetsbaar
Hyacintara (<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>)		Krachtige vogel uit Brazilië, die zeer lastig te kweken is.	100 cm 1500 g	IUCN-status: kwetsbaar

3 HUISVESTING EN VERZORGING

3.1 HUISVESTING

3.1.1 Gezelschap

Alle soorten ara's hou je het beste per koppel of met een groep in een grote voliëre. De vogels zijn heel sociaal en vredelievend, maar de nestkast en de ruimte daaromheen beschouwen ze wel als hun eigen territorium. Als zich eenmaal een koppel vormt, dan hou je die dieren hun hele leven samen.

3.1.2 Verblijf

Ara's kunnen zowel binnen als buiten gehuisvest worden in een ruime kooi of voliëre. Hoe groter de kooi of voliëre, hoe beter. Naast de grootte van de kooi is verrijking in de kooi ook heel belangrijk. Ara's zijn zeer intelligent en gaan zich snel vervelen in een saaie omgeving.



Voor een koppel van een kleine soort is een voliëre nodig van minimaal 300 x 200 x 150 cm (lengte x breedte x hoogte). Voor grote ara's heb je een voliëre nodig van minimaal 400 x 300 x 200 cm (lengte x breedte x hoogte). Voor meerdere koppels met uitvliegende jongen heb je dubbel zoveel ruimte nodig. Het voordeel van een grote voliëre is dat de vogel genoeg lichaamsbeweging krijgt, zodat je zelf minder tijd moet vrijmaken om de vogels buiten de kooi los te laten vliegen. De vogels klimmen graag, en daarom zijn dwarse tralies aangeraden.



Standaardkooien uit de dierenwinkel zijn meestal te klein! Als je de vogel los houdt in huis, is een kleinere kooi voldoende, omdat die kooi dan enkel een slaap- en voerplaats is. Overdag moet de vogel kunnen vliegen, klimmen en op onderzoek gaan in huis of in een veilig ingerichte kamer.

Een voliëre moet gedeeltelijk overdekt en afgeschermd worden tegen weersinvloeden zoals wind en regen. Voorzie een verwarmd binnenverblijf, want de meeste soorten komen uit tropische gebieden en kunnen niet goed tegen de kou. Zorg dat ze beschut zitten en dat er zeker geen tocht is. Een gehele overdekking is niet nodig omdat ze in de zomer de zon en regen (als douche) wel prettig kunnen vinden. Zorg ervoor dat het niet te droog of te koud is, want de vogels houden van een hoge luchtvochtigheid en temperaturen rond de 20 °C.

In het verblijf moeten de volgende zaken aanwezig zijn:

- een nestkast, als schuil- en slaapplek. Voorzie per koppel een eigen nestkast.
- een uv-lamp
- een verwarmd binnenverblijf met een hoge luchtvochtigheid
- zitstokken, met verschillende diktes en structuren om de nagels en poten gezond te houden
- voldoende vliegruimte
- een drinkbak

- een bad om in te baden. Zet het op een plaats waar er geen mest in kan vallen.
- een bakje grit, sepia en maagkiezel voor een goede vertering en calciumopname
- een stofvrije bodembedekking zoals kattenbakkorrels, zeoliet, maïskorrels, beukensnippers of schelpenzand
- speelgoed, touw, papier en voederpuzzels
- takken van wilg, vlierbes of fruitbomen als nest- en verrijkmateriaal

In huis is de plaats van de kooi cruciaal voor de gezondheid van de vogels. Zet de kooi niet bij een warmtebron of in volle zon, maar zorg voor een plaats met deels zon en deels schaduw. Ara's worden ziek van tocht. Lawaai en harde geluiden, zoals van een wasmachine, kunnen de vogels bang maken. Tijdens het koken kunnen voor vogels giftige dampen ontstaan, dus zet de kooi niet in de keuken. Ook rook, parfum en luchtverfrissers kunnen ara's erg irriteren. Ga dus op zoek naar een lichte en geurvrije omgeving in of aan je huis om de ara's te huisvesten.

Tamme ara's houden van interactie en afwisseling. Zet de kooi best in de ruimte waar je zelf ook veel bent. Ze kijken graag vanuit de kooi door een raam voor de afwisseling. Als je de dieren los laat vliegen, doe dan de gordijnen en ramen dicht, anders kunnen ze per ongeluk tegen het raam vliegen of ontsnappen.

3.1.3 Verrijking

Ara's zijn zeer slimme vogels die graag onderzoeken. Ze hebben daarom behoorlijk wat verrijking nodig. Verrijking helpt tegen afwijkend gedrag en verveling. Door nieuwe prikkels te geven, stimuleer je de dieren en doorbreek je de dagelijkse routine. Het kan onder meer bestaan uit het variëren van voeding of het afwisselen van de kooi-inrichting. Wissel speelgoed, klim- en nestmateriaal regelmatig af en plaats de zitstokken regelmatig op een andere hoogte.



Hou de vogels actief door een deel van het voer aan te bieden als voedselverrijking. Het voordeel is dat de vogel dan over langere tijd steeds kleine beetjes eet en zodoende bezig blijft. Het bootst ook zijn natuurlijke foerageergedrag na. Er zijn speciale voederpuzzels te koop met verschillende moeilijkheidsgraden. Je kan er ook zelf maken:

- schuif zaden in de ribbels van karton of vouw ze in karton
- rijg fruit en groenten aan een touw en hang dit op
- geef noten met pel
- verstopt het voer in de volière of strooi een deel van de zaden uit over de vloer

Enkele andere ideeën voor verrijking zijn:


- papier geven om te versnipperen
- wilgen- of fruitboomtakken (eventueel met bladeren) geven
- nieuwe klimbomen, touwen, dozen, enz.



3.2 VOEDING

Ara's eten noten, fruit, groenten en boombladeren. Hun natuurlijke voedsel bestaat uit palmnoten en veel tropisch fruit. Palmnoten zijn bij enkele gespecialiseerde vogelwinkels te koop en bewaar je in de diepvries.

Meestal wordt gevoederd met een zadenmengeling, noten en vruchten. Een dieet van alleen zaden zorgt voor tekorten en wordt afgeraden. Eenzijdig voeren kan de vogel ziek maken en laten vervetten. In de gespecialiseerde vogelwinkels zijn ook speciale pellets voor papegaaien te koop. Dat is correcte, complete voeding. Als je merkt dat ze alleen de lekkerste zaden uit het voer pikken, dan kan je beter een compleet pelletvoer geven.



3.3 DAGELIJKSE VERZORGING

- Verwijder de groenten- en fruitresten.
- Kijk hoeveel er gegeten is en geef nieuw voer.
- Maak eventueel nieuwe voederpuzzels in orde en geef nieuwe takken en speelgoed.
- Geef proper water in de drinkbak en in het bad.
- Geef de vogels aandacht, laat ze los vliegen of geef ze verrijking in de kooi of volière.
- Bekijk of de vogels zich normaal gedragen.

- Gooi alle vuile bodembedekking weg en reinig de kooi of volière grondig.
- Was ook de stokken, touwen en het speelgoed goed af.
- Controleer of er nog genoeg grit, sepia en maagkiezel is.
- Controleer de nagels, veren en de algemene gezondheid van de vogels.
- Ga indien van toepassing met de stofzuiger rond de kooi, want vogels produceren veel stof en gooien soms ook zand en afval uit de kooi.

- Behandel de kooi of volière een aantal keer per jaar tegen parasieten zoals mijten. Haal de hele kooi leeg om alles goed proper te maken. Goede hygiëne is nodig om longproblemen door stof te voorkomen, zowel bij mens als dier. Reinigen kan met heet water, en ontsmetten gebeurt het beste met een javel- of chlooramide-oplossing van 10%. Spoel alles goed na om ook de inname van chloor te voorkomen. Als je met azijn reinigt, moet je de ruimte zeer goed verluchten, want azijn en azijndampen zijn zeer giftig voor vogels. Het beïnvloedt hun kalkopname en is hierdoor mogelijk dodelijk. Zorg er dus zeker voor dat de vogels geen azijn kunnen innemen.
- Vervang ook regelmatig touwen en takken, want daarin kunnen parasieten gaan zitten en de ruwe oppervlaktes zijn moeilijk te reinigen.

////////////////////////////////////



andere gezinsleden. Het beste is om meerdere ara's te nemen van dezelfde soort, zodat ze naar elkaar toetrekken en minder naar één gezinslid. Let op: de ara's kunnen zeer hard bijten en daarbij gemakkelijk een vinger breken, ga dus bedachtzaam om met de dieren en doe ervaring op bij ervaren en kundige papegaaienhouders voor je de ara's aanschaft.

Ara's gaan zich snel vervelen en worden bij weinig afwisseling bang of ontwikkelen gedragsproblemen. Ze kunnen dan gaan verenplukken of schreeuwen. Schreeuwen is een duidelijk teken dat er iets mis is met de vogel en dat die wil aangeven dat hij zich verveelt, zich alleen voelt of bang is. Bedenk daarom dat ara's houden veel van je tijd vraagt, juist omdat ze zoveel aandacht en verrijking nodig hebben. Het worden ook

angstige dieren als je ze niet van jongs af aan en op een ontspannen manier met van alles hebt laten kennismaken.

Als ze in een kooi gehouden worden, moeten de vogels zeker 3 tot 4 uur per dag los kunnen vliegen en bezig zijn. Ze gaan graag uit de kooi op onderzoek uit en komen graag bij jou. Doe dit enkel binnenshuis, anders kan de vogel wegvliegen! Om een ara na het los vliegen in huis terug in de kooi te krijgen, kan je lekker voer in de kooi leggen. Als de vogels de kooi als een veilige thuis beschouwen, zullen ze er ook gemakkelijk terug in gaan.

Het is beter om de vogels niet te trainen om zindelijk te worden, omdat ze anders te lang hun mest ophouden en gezondheidsproblemen kunnen krijgen. In huis zullen ara's in alles bijten en mogelijk dingen stuk maken. Dit hoort erbij en is normaal gedrag. De dieren onderzoeken hun omgeving met hun snavel. Voorzie daarom spullen waarin ze wel mogen bijten. Hang bijvoorbeeld touwen en takken op.



Als je de vogel mee naar buiten wil nemen, moet die al heel tam zijn. Om te voorkomen dat hij wegvliegt, kan je een speciaal vogeltuig omdoen, een reiskooi gebruiken of de vogel kortwieken. Het voordeel van het vogeltuig is dat de vogel zijn complete vleugels kan houden en in huis los kan blijven vliegen. Het nadeel is dat het tuig de vogel kan irriteren, en dat hij zeer tam moet zijn. Het nadeel van kortwieken is dat het de vogel belemmert goed te vliegen, waardoor het dier zich erg onzeker en 'gehandicapt' kan voelen. Ga er dus vanuit dat je met een ara niet zomaar de straat op kan.

Straf de vogels niet en jaag er ook niet achteraan, want dit zorgt voor stress en maakt ze schuw. Als de vogel iets ongewenst doet, probeer dan de situatie zo te veranderen dat de vogel minder snel fouten maakt.



De vogels zijn heel slim en leergierig en zijn dus meer gebaat bij een rustige positieve benadering. Wanneer je een bange vogel toch moet pakken, gebruik dan dikke handschoenen en neem de vogel en zijn vleugels vast. Gebruik sterke handschoenen, want ze kunnen hard en tot bloedens toe bijten. Een andere manier om ze te vervoeren, is de vogels tot in de nestkast te laten gaan en die dan compleet mee te nemen in een reiskooi.

Het geluid dat de ara's maken, kan overlast veroorzaken. Je kan ze het schreeuwen niet afleren en straffen maakt het ongewenste gedrag nog erger. Het is beter om een vaste dagroutine aan te nemen voor het los vliegen en ze voldoende afleiding en verrijking te geven. Geef bijvoorbeeld elke dag ander speelgoed en voedselverrijking om de vogels bezig te houden.

5 GEZONDHEID

5.1 VOORTPLANTING EN BIJHOREND GEDRAG

Kweek enkel als je voldoende ruimte hebt voor alle vogels of op voorhand al verantwoordelijke nieuwe eigenaars voor de jongen gevonden hebt. Er worden zeer veel herplaatsbare vogels aangeboden en vogelasielen hebben ook veel vogels. Daarom raden we af om met papegaaien te kweken. [Als je met CITES soorten wilt kweken, dan moet je ook aan een aantal voorwaarden voldoen.](#)

De verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ara's zijn niet altijd goed zichtbaar. Bij sommige soorten zijn er kleurverschillen, of zijn de vrouwelijke dieren iets kleiner. Voor de zekerheid kan je een DNA-controle laten doen door een speciale vogeldierenarts. Zo weet je zeker of je een mannelijk of vrouwelijk dier hebt.

Voor deze tropische soorten moet de luchtvochtigheid tijdens het broeden continu 55 tot 75% bedragen. Het is vaak lastig om de omstandigheden goed na te bootsen waarin de dieren kweken. Het belangrijkste is om een goed koppel te hebben dat graag samen is. Zorg voor een ruime volière en een geschikte nestkast. Het is moeilijk om te kweken met sommige soorten, zoals de hyacintara. Als het toch lukt om te kweken met deze diersoort, dan loont het de moeite om dit te melden bij lokale dierentuinen en te overleggen of er een fokprogramma kan worden opgestart.

Ara's zijn laat volwassen en beginnen pas te kweken vanaf 4 à 10 jaar, afhankelijk van de soort. Gemiddeld brengen ara's maar om de 1 à 2 jaar jongen voort, en ze leggen dan 2 tot 4 eieren. De broedperiode varieert per soort, maar duurt ongeveer 30 dagen. Soms wordt geadviseerd om de eieren in een broedstoof uit te broeden. Dit is nodig om continu de juiste temperatuur en luchtvochtigheid te garanderen. Het is echter beter om continu in de hele kweekruimte de juiste luchtvochtigheid en temperatuur te garanderen. De ouderdieren zorgen uiteindelijk zeer goed voor de jongen, waardoor de jongen later zelf ook hun eigen jongen correct kunnen grootbrengen. Bij dieren die zijn uitgebroed in een broedstoof, is dit niet zeker.

Nadat de eieren uitkomen blijven de jongen 3 tot 4 maanden bij de ouderdieren en worden ze door beide ouders gevoed. Na het uitvliegen moeten de jongen nog sociale vaardigheden leren van hun ouders en dus zijn ze nog een tijdje afhankelijk van hen. Vogels die te jong bij de ouders zijn weggehaald, hebben daardoor vaak niet de nodige sociale vaardigheden. Als je wilt kweken, dan kies je dus het beste voor vogels die bij de eigen ouders zijn opgegroeid ('natuurbroed').

5.2 MEEST VOORKOMENDE GEZONDHEIDSPROBLEMEN

Gezonde ara's zijn alert, levendig, met schone poten, ogen en snavel en hebben een vol en glad verendek. Een ara die ziek is, trekt zich terug en zet de veren bol.

Er zijn meerdere ernstige ziekten waarvoor je een vogel op voorhand kan laten testen. Laat jaarlijks een gezondheidsonderzoek uitvoeren door een gespecialiseerde vogeldierenarts. Papegaaien kunnen ook drager zijn van parasieten die ziektes veroorzaken bij mensen en ze kunnen ook veel schadelijk fijnstof produceren.

De meest voorkomende gezondheidsproblemen zijn:

- **Vergroeiingen van de poten of snavel**
Symptomen: de poten of snavel groeien scheef.
Dit is meestal het gevolg van te eenzijdige voeding, zoals zaden en zonnebloempitten.

- **Gedragsproblemen**

Symptomen: herhaaldelijk verenplukken, schreeuwen en soms ook agressie naar andere vogels of mensen. Gedragsproblemen komen veel voor bij ara's.

De vogel voelt zich niet goed. Je kan gedragsproblemen verminderen door tegemoet te komen aan de behoeften van de vogels, zoals vliegen, een soortgenoot, speelgoed en voedselverrijking.

- **Papegaaienziekte – Psittacose**

Symptomen bij vogels: lusteloosheid, ontstoken ogen, vieze neus, weinig eetlust.

De papegaaienziekte is zeer besmettelijk voor vogels en mensen. De ziekte is aangifteplichtig en kan ook voorkomen bij vogels die zelf niet ziek lijken. Bij mensen veroorzaakt de ziekte griepsymptomen, ademhalingsproblemen en soms ook een longontsteking. Vogels kunnen voor de aankoop getest worden door een gespecialiseerde vogeldierenarts.

- **Snavel- en veerrotziekte – PBFD – circovirusinfectie**

Symptomen: slechte weerstand, allerlei infecties, afbrokkelende snavel, losse veren.

Behandeling is niet mogelijk, laat de vogel testen voor je hem koopt.

- **Inwendige parasieten** bv. wormen

Symptomen: vermageren, algemene slechte conditie, waterige of gele mest.

Preventief de kooi goed proper houden. Bij symptomen kan de dierenarts speciale ontwormingsmiddelen voor vogels voorschrijven.

- **Uitwendige parasieten** bv. luizen, mijten, schurft

Symptomen: jeuk, kale plekken, schilfertjes, witte korrelige 'kalkpoten', lusteloosheid.

Uitwendige parasieten kan je niet altijd voorkomen, mijten zitten soms in hout en speelgoed. Zorg voor een goede weerstand en ga bij één van de symptomen direct naar de dierenarts.

- **Legnood of te veel eieren leggen**

Symptomen: de vogel legt heel veel eieren of juist geen, zit met opgezette veren en is lusteloos.

Er moet een goede balans zijn in het aantal eieren dat de vogels leggen. Je kan ervoor zorgen dat de vogel minder eieren gaat leggen door er nepeieren bij te leggen en 8 tot 10 uur licht te voorzien. Een vogel die zijn ei niet kan leggen, moet dringend door een dierenarts geholpen worden.

6 AANKOOP OF ADOPTIE

Ara's houden is een taak voor gevorderde vogelkenners en doe je beter niet in een gehorig huis. Het zijn zeer intelligente vogels en het kan moeilijk zijn om ze een goede leefomgeving aan te bieden. Als je slechts één vogel houdt, dan kan de relatie daarmee intensief zijn en moet je er dagelijks meerdere uren aandacht aan geven. Volgens kenners moet je aan de verzorging van een ara evenveel tijd besteden als aan een kind van 4 jaar. Voor de ara's zelf is het beter om ze met twee of in groep te houden, liefst in een grote volière zodat ze niet van de eigenaar afhankelijk zijn voor voldoende beweging.

Voor mensen met een lage weerstand is het af te raden om papegaaien te houden. Papegaaien kunnen drager zijn van diverse ziektes en veroorzaken fijnstof dat gezondheidsproblemen kan geven.

De volgende vragen helpen je over de aankoop van ara's na te denken:

- Heb je er rekening mee gehouden dat ara's tot 80 jaar oud kunnen worden?
- Is er niemand in huis allergisch voor vogelstof?
- Kan je tegen het soms heel luide geschreeuw of zullen de burens daar last van hebben?
- Heb je genoeg ruimte voor een ruime kooi of volière?
- Heb je genoeg tijd voor de verzorging en onderhoud?
- Is er iemand die de vogels kan verzorgen als je op vakantie gaat?
- Heb je voorzien dat vogels moeten kunnen vliegen en dan niet zindelijk zijn?
- Heb je ongeveer 25 tot 50 euro per maand per ara over voor de voeding en verzorging?

Je kan ara's kopen bij kwekers, een gespecialiseerde dierenwinkel en soms ook adopteren in een vogelopvang. Als je een tamme vogel wilt, kies je het beste een vogel die ook in een huishouden is opgegroeid, in contact met mensen.

Vraag bij de gemeente na hoeveel vogels je mag houden als hobbyhouder voor je de ara's koopt. In een rijwoning of appartement is het niet altijd toegestaan om papegaaiachtige vogels te houden.

Alle ara's die je koopt, moeten geringd zijn met een gesloten ring en het moet mogelijk zijn de kweker te identificeren. [Sommige soorten moeten een CITES-certificaat hebben](#). Hierbij moet je dus een overdrachtsverklaring of een verklaring van kweek krijgen. Deze documenten tonen aan dat de vogel niet op een [illegale manier](#) verkregen is. De populaties in het wild nemen sterk af door de vangst van jonge dieren voor de huisdierenmarkt. Let dus extra goed op dat je de dieren op verantwoorde manier verkrijgt.

Als koper ben je verantwoordelijk voor een goede keuze. Kies een gezonde ara, met een compleet verenkleed en die al goed zelfstandig eet. Kies géén handopfok, geïmporteerde of zwakke dieren, want daarmee hou je foutieve handel in stand. Handopfokvogels krijgen sneller gedragsproblemen. Vogels die door hun ouders zijn opgevoed, hebben een betere gezondheid en betere sociale vaardigheden. Ze worden bovendien even tam als handopfok-vogels. Als je verwaarloosde dieren opmerkt, dan kan je dit melden bij de Dienst Dierenwelzijn op het [Meldpunt verwaarloosde en mishandelde dieren](#).

Richt de volière of kooi in voor je de ara's koopt. Zorg bij de introductie van de dieren in hun verblijf voor veel schuilplaatsen zodat de dieren rustig kunnen wennen. Geef in het begin ook hetzelfde voer als de vorige eigenaar en laat ze rustig aan een nieuw voer gewennen. Als je al vogels hebt, hou je de nieuwe vogel het beste 3 weken apart om te zien of hij ziektevrij is.

7 KOSTEN

De prijs van een ara hangt af van de soort en kleur. De prijzen variëren van 650 tot meer dan 2000 euro.

Bij de aankoop heb je een kooi of volière nodig met een nestkast, water- en voerbak, verschillende zitstokken en speelgoed. Deze benodigdheden koop je vanaf 250 euro. Een volière maken kost al snel 400 euro als je ze zelf bouwt of enkele duizenden euro's als je een grote volière laat bouwen.

Maandelijks kosten de bodembedekking en het voeren van een ara ongeveer 25 tot 50 euro. Als de vogel ziek wordt, moet je een gespecialiseerde dierenarts raadplegen. De kosten hiervoor kunnen hoog oplopen. Een test om het geslacht te bepalen en ziektes uit te sluiten kost 100 tot 200 euro per vogel.



Postadres

Koning Albert II-laan 15 bus 548
1210 Brussel
vlaanderen.be/dierenwelzijn